


## 幸福婦產科 常用藥物簡介

藥品名稱	圖片	孕級/授乳	用途及注意事項
<u>不孕症之治療藥物</u>			
<a href="#">Decapeptyl 0.1mg 注射劑</a>		X/乳(-)	可快速促進內生性 LH 升高 (LH surge)，作為特殊破卵針或改善卵子品質使用。
<a href="#">Menopur 75iu 注射劑</a>		X/乳(?)	排卵針(FSH+LH)用於誘導卵巢濾泡成長
<a href="#">Ovidrel 250mcg 注射劑</a>		X/乳(?)	破卵針，刺激卵子成熟排出，打完針 36-38 小時排卵，可進行自然同房、人工授精或取卵供試管嬰兒使用。
<a href="#">Crinone 8% Vag Gel</a>		B/乳(?)	陰道用凝膠劑 (黃體支持、安胎之用)。
<a href="#">Clomiphene 50mg</a>		X/乳(?)	<p>是一簡單、安全、有效又便宜的促進排卵藥物。</p> <p>用法：一般是月經的第 3-5 天開始使用，連續使用 5 天。</p>

			用途：幫助濾泡生長發育成熟
<a href="#">Femara 2.5mg 復乳納</a>  <a href="#">(Letrozol)</a>		D / 乳(?)	不孕症醫師利用它能降低組織及血液中女性賀爾蒙的含量，經由反饋作用，刺激腦下垂體產生及分泌更多的濾泡刺激賀爾蒙，血中濾泡刺激賀爾蒙的增加可刺激卵巢產生更多的卵子，達到刺激卵巢排卵的目的。

### 抗生素

#### Penicillins 青黴素

<a href="#">Amoxicillin 500mg</a>		B / 乳(?)	1. 第三代青黴素，有 PCN 過敏病史者不宜使用。  2. 用於感冒、乳腺炎
-----------------------------------	--	----------	---





#### Cephalosporins 頭孢子類抗生素

<a href="#">Cephalexin 500mg</a>  <a href="#">(Keflex)</a>		B / 乳(?)	1. 第一代頭孢子類抗生素，對頭孢子菌素類抗生素過敏之患者禁用本藥  2. 用於呼吸道、泌尿道的感染
--	---	----------	--

#### Tetracyclines 四環素

<a href="#">Doxycycline 100mg</a>  <a href="#">(Doxycycline)</a>		D / 乳(-)	1. 用於骨盆腔發炎、青春痘治療  2. 光過敏性紅斑反應，須避免長
--	---	----------	--

			<p>時間曝曬或做好防曬</p> <p>3.服藥時應避開乳製品(牛奶、優格、奶酪)、鈣、鐵、制酸劑</p>
Macrolides 巨環類抗生素			
<p><a href="#">Zithromax 250mg</a></p>		B /乳(?)	<p>1.新一代巨環類抗生素常用於披衣菌感染</p> <p>2.一星期服用 3 天，一天 2 粒空腹服用</p>
Quinolones 恩莖類			
<p><a href="#">Nalidixic acid 500mg</a> (Nagacide)</p>		B /乳(-)	<p>1.第一代 Quinolones 抗菌劑</p> <p>2.口服吸收迅速</p>
<p><a href="#">PEPEMIDIC ACID</a> <a href="#">Dolcol</a></p>			<p>1. 第二代 Quinolones 抗菌劑</p> <p>2. 治療尿路感染每日 500-2000mg 分 3-4 次服用</p>
<p><a href="#">Ofloidal 200</a> (Tarivid)</p>		C /乳(-)	<p>1.第三代 Quinolones 抗菌劑</p> <p>2.用於骨盆腔、尿道感染</p>

<p><a href="#">CIPROFLOXACIN F.C. TABLETS 500MG</a></p>		<p>C/乳(-)</p>	<p>光敏、避高鈣製品、忌酒、減少操作機械開車</p>
<p>Sulfonamides 磺胺類</p>			
<p><a href="#">CO-TRIZOL (Baktar)</a></p>		<p>C,D/乳(-)</p>	<p>1.磺胺藥過敏者、蠶豆症的患者禁用 2.常見副作用包含頭暈、噁心、嘔吐、腸胃不適等</p>
<p>Miscellaneous 其它類抗生素</p>			
<p><a href="#">CLEDOMYCIN CAPSULES 150MG "ASTAR" (CLINDAMYCIN) (Cleocin)</a></p>		<p>X/乳(?)</p>	<p>2.厭氧菌感染、骨盆腔發炎</p>
<p>解頻尿</p>			
<p><a href="#">Uroprin 100mg</a></p>		<p>B/乳(?)</p>	<p>1.泌尿生殖器粘膜的鎮痛 2.服藥後尿液會呈現橘黃色 3.pyrin 過敏、蠶豆症病人禁用</p>
<p><a href="#">FUCOTIN F.C. TABLETS 200MG (FLAVOXATE) "KOJAR" (Flavoxate Hcl)</a></p>		<p>B/乳(?)</p>	<p>1.直接作用於膀胱逼尿肌，緩解膀胱過度收縮 2.抗膽鹼作用非常微弱，所以副作用少</p>

## 抗滴蟲劑和抗黴菌劑

DYNIN 250MG

(Flagyl)




B/乳(-)

- 1.用於厭氧菌感染、滴蟲感染
- 2.滴蟲感染:七日療程: 1# tid /或 2# bid, 單日療程 (single dose 2g): 8# qd
- 3.服藥期間勿飲酒  
(因為藥物與酒精間的相互作用, 將使身體產生許多嚴重的不良反應, 如噁心、嘔吐、頭痛以及臉部潮紅)

FLU-D 50mg

(Diflucan)



C/乳(-)

- 1.優點: 服用方便, 雖然肝功能不會因長期使用產生嚴重影響, 但要監測肝功能及避免酒精的使用
- 2.一次服用 3#, 維持一星期療效

Icomein 100mg

(Itraconazole)



C/乳(-)

- 全身性或深部黴菌感染
- 一天 2 膠囊, 連續治療 3 天

NYSTATIN TABLETS 500000 units "Y.C."



C/乳(?)

- 白色念珠菌感染的首選藥物, 副作用少, 安全性高



## 抗病毒藥

[Acyclete Tab - 400mg](#)

[\(Acyclovir\)](#)



B/乳(?)

- 1.抑制病毒複製
- 2.治療疱疹病毒感染最佳用藥

## 止痛藥

[TINTEN 500mg](#)

[\(Scanol\)](#)



B/乳(+)

- 1.解熱鎮痛
- 2.較少人過敏，不傷胃，但大量使用仍傷肝
- 3.國外胎兒用藥安全網站:只會分泌微量到乳汁,但證實對授乳是安全的

## 非類固醇抗發炎藥 NSAIDs

[Bokey 100mg](#)

[\(Aspirin\)](#)



C, D  
級/乳(-)

- 1.目前用於預防血栓、預防重複性流產
2. pyrin 過敏、蠶豆症病人禁用

[SU-AN 400MG](#)

[\(Brufen\)](#)



B, D/乳  
(-)

- 消炎、鎮痛、解熱作用






<p><a href="#">COTON 500 mg</a></p> <p><a href="#">(Ponstan)</a></p>		<p>C, D / 乳 (-)</p>	<p>經痛、經血過多、鎮痛、抗炎</p>
<p><a href="#">VOREN 50MG</a></p>		<p>C / 乳(?)</p>	<p>緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛</p>
<p><b>類固醇</b></p>			
<p><a href="#">Dexamethasone Tablets</a></p> <p><a href="#">"C.L"</a></p> <p><a href="#">(DECAN 0.75)</a></p>		<p>C / 乳 (?)</p>	<p>副作用為引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。</p>
<p><b>止癢、抗過敏</b></p>			
<p><a href="#">VENA 10MG</a></p>		<p>B, / 乳(?)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>服藥期間避免開車 or 從事潛在危險性活動</li> <li>不可飲酒，可能加重對中樞神經抑制作用</li> <li>鎮靜劑、安眠藥會增加本藥的鎮靜作用</li> </ol>

<p><a href="#">Denosin Tab 5mg</a></p>		<p>C/乳(-)</p>	<p>勿飲酒。 請勿開車 須防曬。</p>
<p><a href="#">SOMIN 2mg</a> <a href="#">(D-CTM)</a></p>		<p>B/乳(?)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>服藥期間避免開車 or 從事潛在危險性活動</li> <li>不可飲酒，可能加重對中樞神經抑制作用</li> <li>鎮靜劑、安眠藥會增加本藥的鎮靜作用</li> </ol>
<p><b>退奶藥</b></p>			
<p><a href="#">Dostinex 0.5mg</a></p>		<p>B/乳(?)</p>	<p>具有強力又長效抑制泌乳激素的作用 服用次數少(一星期2次，一次一粒)</p>
<p><b>胃腸道的藥物</b></p>			






<p><u>PRIMRAN F.C. TABLETS</u> <u>(METOCLOPRAMIDE)</u> <u>"ROYAL"</u></p>		<p>X</p>	<p>止吐 不可用於有 EPS 之病人</p>
<p><u>Molin Tab. 10mg</u> <u>Domperidone 10mg,</u></p>		<p>C</p>	<p>禁忌 1. 中度至嚴重 肝功能障礙者。 2. 已知存在延 長心臟傳導間 隔，特別是 QTc，有顯著電 解質異常或原有 心臟疾病（如鬱 血性心衰竭） 者。 3. 併用可 能引起 QT 延長 之藥品。 4. 併 用強力 CYP3A4 抑制劑（不管是 否有 QT 延長之 作用）。</p>
<p><u>Buscopan S.C. Tab -10mg</u></p>		<p>C/乳(?)</p>	<p>抗痙攣及運動亢 進 副作用：輕微口 乾、思睡、視力 模糊</p>
<p><u>GASMIN TAB 40MG</u></p>			<p>消脹氣</p>

<p><a href="#">Magnesium Oxide 250mg</a> <a href="#">(MgO)</a></p>		<p>B/ 乳(+)</p>	<p>軟便劑</p>
<p><a href="#">WEIDECONE</a> <a href="#">(GELUSIL)</a></p>			<p>制酸劑</p>
<p><a href="#">Through 12mg</a> <a href="#">(Sennoside)</a></p>		<p>C/乳(?)</p>	<p>緩解便秘</p>
<p><a href="#">Bisadyl E.C. Tablet 5mg</a> <a href="#">(DUCOLAX)</a></p>		<p>B.C/乳 (?)</p>	<p>本品為腸溶衣錠劑應整粒吞服，勿剝半或嚼碎，且一小時內不可與牛奶或制酸劑服用</p>
<p><a href="#">ELININ CAPSULES</a> <a href="#">(LOPERAMIDE)"SHINLON"</a> <a href="#">(Imodium)</a></p>		<p>B/乳(?)</p>	<p>止瀉</p>

<p><a href="#">STROCAINE</a>  <a href="#">STOIN TABLETS 10MG</a>  <a href="#">(OXETHAZAINE) "KOJAR"</a></p>		<p>N/乳(?)</p>	<p>有時會引起食慾不振、噁心、口渴、便秘、下痢等症狀。</p> <p><b>整粒吞服，不要咬碎</b></p>
<p><a href="#">Famotidine F.C. Tablets 20 mg "CYH"</a></p>		<p>B/乳(-)</p>	<p>孕期服藥安全性未定，建議評估其風險與利益後再投與；因本藥會分泌到乳汁，不建議授乳</p>
<p><b>感冒藥</b></p>			
<p><a href="#">WATOLIN TABLETS 8MG</a>  <a href="#">(Bisolven)</a></p>		<p>FDA 沒收載</p>	<p>化痰止咳：降低支氣管分泌物的黏稠度，間接解除咳嗽</p>
<p><a href="#">Lysozyme 90mg</a>  <a href="#">(KOJAZYME TABLETS 90mg "kojar")</a></p>		<p>FDA 沒收載</p>	<p>消腫：促進炎症時之組織修復  化痰：分解膿黏液，以利排出</p>
<p><a href="#">METHON 30MG</a>  <a href="#">(Medicon)</a></p>		<p>C/乳(?)</p>	<p>Medicon  鎮咳(抑制咳嗽中樞，可降低咳嗽發作的頻率和強度)</p>

<p><a href="#">Peace</a> <a href="#">Pondec Tab.</a></p>			<p>副作用：嗜睡 注意事項：不得併用鎮靜劑或安眠劑、酒精等</p>
<p><a href="#">Cold Capsules</a> <a href="#">(CANMOR) “ASTAR”</a></p>			<p>感冒諸症狀 (鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、發熱、頭痛、咽喉痛、肌肉痛)之緩解</p>
<p><b>雌激素和黃體激素</b></p>			
<p><a href="#">Estromon 0.625mg</a> <a href="#">(Premarin)</a></p>		<p>X/乳(-)</p>	<p>更年期障礙、卵巢欠缺症狀、卵巢機能不全、機能性子宮出血</p>
<p><a href="#">Medrone Tablets 5 mg</a> <a href="#">(Provera)</a></p> <p><a href="#">Medrone 10mg</a> <a href="#">(Provera)</a></p>	<p>Medrone 5mg/Tab 美得能錠</p>  <p>高雄醫學大學附設中和紀念醫院版權所有 109.02月製</p> <p>編號 PMC037M 藥名 MedroxyPROGESTERone acetate 10mg/tab 英文商品名 Medrone 中文商品名 美得能錠 製造廠 健喬信元 健保碼 AC34799100</p>  	<p>X/乳(-)</p>	<p>繼發性閉經、官能性子宮出血</p>



<p><a href="#">Norina 5mg</a> <a href="#">(Primolut-N)</a></p>		<p>X/乳(-)</p>	<p>須黃體荷爾蒙治療之婦科疾患，機能不全性子宮出血及其復發之預防</p>
<p><a href="#">Provera tab 5mg</a> <a href="#">(普維拉)</a></p>		<p>X/乳(-)</p>	<p>可空腹服用，或於用餐後服用，以減少噁心之副作用</p>
<p><a href="#">Utrogestan 100mg</a></p>		<p>B/乳(+)</p>	<p>預防因黃體期障礙造成的習慣性流產</p>
<p><a href="#">SYNNA TABLETS</a></p>		<p>X/乳(-)</p>	<p>每天一次，每次一錠，按照包裝鋁箔上指示之順序由白色錠劑開始使用，11天之後改為藍色錠劑，然後休息7天之後再開始服用第二片</p>



COVINA F.C. TABLETS.



X/乳(-)

剛開始使用的前幾個月，可能發生出血或點狀出血，通常這些現象都是短暫的

安胎藥

ANPO TABLETS 10MG



B/乳(-)

安胎藥，子宮鬆弛效果更強  
副作用：改變心跳速度及血壓/  
暫時提昇血糖及胰島素/低血鉀/  
心悸/噁心

避孕藥

Tinpreg Tablets 1.5mg  
"Sinphar" 韻婷




1 顆/盒

本治療法一次服用一片錠劑。此法在無避孕措施的性交後，愈早使用效果愈好。最好在 12 小時內服用，最久不超過 72 小時(3 天)。

韻婷錠可在月經週期中的任何時候服用。在使用本緊急性避孕藥後，建議在下次月經來臨前使用局部避孕法避孕(如：保險套、殺精劑、子宮頸帽)，使用韻婷

			錠後可以繼續使用常規性的荷爾蒙避孕法。
<p><a href="#">Ella 艾伊樂 30mg (Ulipristal acetate)</a></p>		<p>1 顆/盒</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新的選擇性黃體素接受器調節劑，口服吸收快，<b>阻礙或延遲</b>排卵的發生及<b>干擾</b>受精卵的<b>著床</b>。</li> <li>2. 在沒有避孕措施之性交後五天(120小時)內使用，作為緊急避孕藥。</li> <li>3. 常見副作用包括頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、頭暈、疲倦(都屬輕微,大幅降低了傳統事後避孕藥的副作用)</li> </ol>
<p><a href="#">Diane</a></p>		<p>21tab/box</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●低劑量口服避孕藥</li> <li>●含抗雄性素成分，是唯一有<b>明確青春痘治療</b>效果之口服避孕藥</li> <li>●適合有青春痘或皮脂過多困擾之女性</li> </ul>

[Gynera](#)



21tab/box

- 低劑量口服避孕藥
- 長期使用，週期控制佳，耐受度良好，且對體重影響極小
- 適合從未服用避孕藥，或由中劑量避孕藥轉服者

[Mercilon tablets](#)



21tab/box

- 便宜
- 通常用於體重較輕的女性

[YAZ](#)



24+4

- 低劑量口服避孕藥
  - 減緩荷爾蒙波動,降低經前症候群
- 少用(因為顆數特別，一方面用來替換其他避孕藥的時候會很不方便)

Yasmin



21tab/box

- 低劑量口服避孕藥
- 服用者的耐受性極佳，對體重影響小
- 本品易造成鉀離子升高，肝腎功能不佳不適合

NuvaRing



- 陰道避孕環，一個月僅需使用一次的避孕方式
- 會定量釋放低劑量荷爾蒙藥物，經陰道上皮吸收後發揮作用

Winstop 28




藥品有 21 顆橘色錠 (含活性成分)，7 顆白色錠 (不含活性成分)。經期第一天或第五天開始服用第一顆橘色錠，每天相同時間服用一顆持續服用，橘色錠服用完畢後服用白色錠，直至整盒 28 顆服用完畢後，接著服用新的一盒，不可中斷

藥水



TCA(三氯醋酸)

Trichloroacetic Acid



菜花化學燒灼、止血  
一種化學破壞劑，可腐蝕皮膚組織

藥膏

ANCLOZIN CREAM  
50MG/GM  
Root(ACYCLOVIR)



B

治療由單純疱疹引起的感染

Gentamycin Cream 5gm



D

發膿性皮膚病、感染性濕疹、皮膚炎、灼傷及其他革蘭氏陰性陽性菌之感染。

MYCOMB CREAM



C


Triamcinolone Acetonide: 為強力之賀爾蒙，具有消炎止癢及抗過敏之效能，對於皮膚之發炎症狀藥效迅速，完全且持續性長。

Nystatin: 為最有獨特性之抗念珠菌藥物，可用來治療由白色念珠菌和其他酵素



類之黴菌引起之皮膚病。  
Neomycin 及 Gramicidin 二種抗生素之配合不但具有更廣效性之殺菌作用，且對產生耐藥性之細菌本配合之抗生素獨具強力之殺菌性。

[High-Xylmol Oint -10gm](#)



C

(1) 外痔：早、晚及排便後使用 1 次。以溫水洗淨肛門，擦拭乾後，再取適量軟膏塗抹於患部。

(2) 內痔：早、晚及排便後使用 1 次。將軟膏套上內附之軟管注入器，再行插入肛門內，輕壓軟膏管，同時緩慢拉出軟管注入器，使軟膏均於塗抹於內痔患處

[Aldara\(樂得美\)](#)







B

用於治療成人（18歲以上患者）外生殖器和肛門周圍的疣和溼性尖疣

尖型濕疣(菜花)→擦 1 天休 1 天

→ 一週回診一次

<p>EC</p> <p>(Econazole、Clobetasol、CB)</p>			<p>止癢、抗過敏與黴菌</p>
<p><a href="#">Premarin vag Cream14 克</a></p>		<p>X</p>	<p>用於萎縮性陰道炎及更年期性外陰萎縮症。  <b>一般建議劑量為每天一次，每次0.5-1g，必須週期性給藥(例如使用三個星期，休息一個星期)</b> 嘗試停用或逐漸減少用藥時，須經3至6個月之緩慢減少使用。</p>
<p><b>塞劑</b></p>			
<p><a href="#">Albothyl 90mg</a></p>		<p>D</p>	<p>子宮頸糜爛、白帶、陰道炎、子宮頸炎(含由毛滴蟲及念珠菌引起者)，塞完後數日後會有未吸收的白色藥膜排出是正常的。</p>
<p><a href="#">Camazole 100mg</a></p>		<p>C</p>	<p>治療陰道念珠菌及滴蟲所引起之陰道感染</p>

<p><a href="#">Frotin 250mg</a></p>		<p>B</p>	<p>陰道細菌或滴蟲感染所引起之陰道炎</p>
<p><a href="#">Lomexin 200mg</a></p>		<p>C</p>	<p>治療女性陰道黴菌及念珠菌感染</p>
<p><a href="#">ECONAZOLE SUPP</a></p>		<p>C</p>	<p>念珠菌感染引起之陰道炎</p>
<p><b>其他</b></p>			
<p><a href="#">Ergometrine 0.2mg</a> <a href="#">(Ergo)</a></p>		<p>X</p>	<p>麥角鹼衍生物，可刺激子宮收縮，有助於產後子宮復原或排經止血。 (1)有高血壓、妊娠中毒症、心疾病、閉塞性血管障害、肝疾患、腎疾患及敗血症患者需慎重投予。(2)本品有蓄積作用，投藥時需注意</p>

Propra Tablets 10mg  
"Royal" (Propranolol)



C/乳(-)

1. 本藥對糖尿病人會造成血糖過低，但對非糖尿病人則無此效應。

2. 雖然本藥之血漿濃度可以探知但它與藥理效應之間常常不是如預

期的關係，因此，由心跳速率與血壓的測定來標定劑量，常用於指

引治療。

3. 用於親鉻細胞瘤之治療時，不可單獨使用本藥，必須與  $\alpha$ -Blocker

類藥品合併使用。

4. 若有下列醫療問題存在時，本藥切勿使用：支氣管氣喘、心臟性休

克、心臟阻斷、顯著的心臟衰竭、心竇性心動徐緩

<p><a href="#">TRANSAMIN 250MG</a></p>		<p>B</p>	<p>下列患者請謹慎使用</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有血栓的患者及可能引起血栓的患者。</li> <li>2. 消耗性血液凝固障礙的患者。</li> <li>3. 曾對本劑有過敏的患者</li> </ol>
<p>Folic acid 葉酸 800 <math>\mu</math>g</p>		<p>一天一顆 100 顆/瓶</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Folic acid 是懷孕初期最需要的營養素，可維持胎兒的正常生長與發育，而減少神經管缺損的發生</li> <li>2. 衛生署建議 Folic acid 每日攝取量~成人:400 <math>\mu</math>g、孕婦:800 <math>\mu</math>g、哺乳期:500 <math>\mu</math>g</li> </ol>
<p>新保麗能 New Preg</p>		<p>60 粒/盒</p>	<p>每天 1 顆，飯後與水吞服，多食無益</p> <p>完整 21 種營養素和礦物質</p> <p>維生素 B1、B2、B6、B12、生物素、泛酸、葉酸、菸鹼素。維生素 C、維生素 D2、維生素 E。維生素 A 和胡蘿蔔素。豐富礦物質和微量元素：鎂、鈣、鉻、錳、鐵、銅、鋅、碘</p>



<p>鈣補 Seafood</p>		<p>60 粒/盒</p>	<p>天然海藻鈣加鮭魚油，好吸收，無負擔補充鈣質、礦物質、魚油 DHA 能幫助鈣吸收進去</p> <p>每次 2 顆，每天 1-3 次。飯後或睡前，多食無益。</p>
<p>Soy Bean 寶德大豆寶</p>		<p>30 顆/瓶</p>	<p>純素食成分的軟膠囊，好吞小膠囊，新鮮氣密封裝，緩式釋放好吸收</p> <p>大豆寶軟膠囊適合隨身攜帶，每顆膠囊只有 2 大卡熱量，並且供 30 毫克的大豆異黃酮，大約是吃 130 公克的豆腐所提供的含量</p> <p>每日一顆，飯後服用，多食無益</p>
<p>U-relax 優芮珂絲</p>		<p>28 顆/瓶</p>	<p>1.成份中的女性專用益生菌株可幫助腸道、陰道、泌尿道維持平衡狀態</p> <p>2.建議服用方式:          第一星期(生理調養期):每晚睡前 2 顆          第二星期(生理調養期):每晚睡前 1 顆          第三星期(保養期):每三天服用 1</p>

			<p>顆</p> <p>建議連續服用 2 個月，可以達到最佳防護效果</p> <p>3.服用抗生素期間必須間隔 2 小時</p>
<p>Tofipan-S 特補樂</p> <p>DHEA</p>		<p>60 顆/盒</p>	<p>DHEA 用來治療改善卵巢功能早衰症、卵巢異常老化症</p>